

## SCHEDULING STATUS **S1**

### PROPRIETARY NAME (AND DOSAGE FORM)

## Coryx Throat Solution

### COMPOSITION

Each 100 ml of solution contains:

Benzocaine	266,667 mg
Chlorhexidine gluconate solution 20 %	1,0 ml

Other ingredients: Acesulfame-K, carmoisine red, cinnamon flavour, ethanol 96 %, glycerine, mint aniseed flavour, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, propylene glycol and purified water.

### PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

A.16.3 Surface anaesthetics

### PHARMACOLOGICAL ACTION

#### Pharmacodynamics:

Benzocaine has mild local anaesthetic properties. Chlorhexidine is a bactericidal cationic antiseptic. It acts by destroying the bacterial cell membrane and precipitating the cell cytoplasm. It has been shown that chlorhexidine binds on to the hydroxyapatite of tooth enamel, on to the pellicle of the tooth surface and on to salivary mucins. It slowly desorbs from these sites exerting a prolonged bactericidal effect for several hours.

#### Pharmacokinetics:

Benzocaine is readily absorbed through mucous membranes, and through damaged skin. Local anaesthetics are weak bases and at tissue pH can diffuse through connective tissue and cellular membranes to reach the nerve fibres where ionisation can occur. Benzocaine is hydrolysed by esterase in the plasma and to a lesser extent, in the liver. Chlorhexidine is poorly absorbed from the gastrointestinal tract and intact skin.

#### INDICATIONS

CORYX THROAT is indicated for the temporary relief of pain and discomfort in sore throats due to colds (and accompanying tickling cough). It is also recommended for minor mouth irritations.

#### CONTRA-INDICATIONS

CORYX THROAT is contra-indicated in patients with a history of hypersensitivity to local anaesthetics or to any of the other ingredients of CORYX THROAT.

#### WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS

##### Warnings:

Do not swallow.

##### Special precautions:

Some patients may experience a bitter aftertaste in the mouth after rinsing the mouth with CORYX THROAT. Rinsing the mouth with water immediately after using CORYX THROAT may increase the bitterness and decreases the effect of CORYX THROAT. CORYX THROAT may alter the taste of food in some patients. This effect may last up to 4 hours after the use of the oral rinse. In most cases this effect will become less noticeable as the patient continues to use CORYX THROAT. When the use of CORYX THROAT is stopped, taste should return to normal. CORYX THROAT contains acesulfame-K and must not be given to patients with phenylketonuria.

##### INTERACTIONS:

No known interaction with other medicines.

##### PREGNANCY AND LACTATION:

The safety of CORYX THROAT in pregnancy and lactation has not been established.

##### DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

###### Gargle:

Adults: 15 - 30 ml (3 - 6 medicine measuresful)

Children 6 to 12 years of age: 5 - 15 ml (1 - 3 medicine measuresful)

Use CORYX THROAT undiluted, or diluted with a small quantity of warm water and thoroughly rinse the mouth for about one minute every 3 - 4 hours as needed. Depending on the location of the pain, the solution should be swished around the mouth and/or used as a gargle. It should not be swallowed. CORYX THROAT should generally be used undiluted, but if stinging occurs, the rinse may be diluted with a small quantity of warm water.

###### Spray:

Adults: Spray four (4) to eight (8) sprays directly onto the painful or inflamed area, with a maximum of 32 sprays per day.

Children 6 to 12 years of age: Spray two (2) to four (4) sprays directly onto the painful or inflamed area, with a maximum of 16 sprays per day.

Rinse mouth and back of throat with the solution. Do not

swallow the (excess) solution. Repeat every one and a half (1½) to three (3) hours as necessary.

#### How to use the spray (see pictures)

1. Turn the nozzle sideways and upwards for 90 degrees in a clockwise direction (Figure 1).


Do not pull the nozzle upwards and to the front (Figure 2).

When using for the first time, depress/push the spray cap a few times until liquid is sprayed out from the nozzle.

Spray the correct number of sprays (see above for the dosage) directly onto the painful or inflamed area, in the back of the throat, while avoiding spraying directly onto the teeth (Figure 3).

2. Do not breathe in while spraying as liquid may enter the bronchus or lung if sprayed while breathing in.

3. After use, rinse the tip of the nozzle under warm water, dry and turn the nozzle back to the original position for storage (Figure 4).



#### SIDE-EFFECTS

##### Immune system disorders:

*Less frequent:* Signs of allergic reactions may include nasal congestion; shortness of breath or troubled breathing; skin rash; hives or itching; or swelling of the face.

##### Eye disorders:

*Less frequent:* Irritation of the conjunctiva.

##### Skin and appendages disorders:

*Less frequent:* Local skin sensitivity reactions, prolonged use may cause discolouration of the teeth. Large swellings in the mouth or throat.

##### Gastro-intestinal disorders:

*Less frequent:* Irritation of the mucous membranes, tongue tip irritation, reversible discolouration of tongue, teeth and or composite dental restorations. Taste disturbances and a burning of the tongue. Increase in tartar (calculus) on teeth.

##### Body as a whole – general disorders:

*Less frequent:* Swollen glands on side of face or neck.

#### KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT:

The main consequence of ingestion is mucosal irritation. Gastric lavage with demulcents is suggested for acute ingestion. Methaemoglobinaemia has occurred in infants after absorption of benzocaine. Excitation with subsequent depression of the central nervous system. Treatment is symptomatic and supportive.

If you think your child has swallowed CORYX THROAT get emergency help at once. In addition, if a child of any age drinks CORYX THROAT and has symptoms of alcohol intoxication, such as slurred speech, sleepiness, or a staggering or stumbling walk get emergency help immediately.

#### IDENTIFICATION:

Red to pink, slightly opaque solution.

#### PRESENTATION:

Gargle: Amber glass bottles with a white plastic screw-on cap containing 200 ml solution. The bottle is packed into an outer carton.

Spray: Amber glass bottles with a white plastic screw-on cap with spray nozzle containing 100 ml solution. The bottle is packed into an outer carton.

#### STORAGE INSTRUCTIONS:

Store at or below 25 °C. Protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

#### REGISTRATION NUMBER:

W/16.3/58

#### NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION:

Mirren (Pty) Ltd  
18 Golden Drive, Morehill, Benoni 1501  
South Africa

#### DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

Date of registration: 12 October 1988.

Date of the most recently revised package insert as approved by Council: 6 June 2014.

CXT100-PI-PR-17/05

## PATIENT INFORMATION LEAFLET

### SCHEDULING STATUS **S1**

### PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM

## CORYX THROAT Solution

Each 100 ml solution contains: 266,667 mg benzocaine and 1,0 ml chlorhexidine gluconate solution 20 %. Solution.

**Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.**

CORYX THROAT is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use CORYX THROAT carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share CORYX THROAT with another person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.

You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 5 days.

#### 1. WHAT CORYX THROAT CONTAINS

• The active ingredients are: Each 100 ml solution contains: 266,667 mg benzocaine and 1,0 ml Chlorhexidine gluconate solution 20 %

• The other ingredients are: Acesulfame-K, carmoisine red, cinnamon flavour, ethanol 96 %, glycerine, mint aniseed flavour, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, propylene glycol, and purified water.

#### 2. WHAT CORYX THROAT IS USED FOR

CORYX THROAT is used for temporary relief of pain and discomfort in sore throats due to colds (and accompanying tickling cough). It is also recommended for minor mouth irritations.

#### 3. BEFORE USING CORYX THROAT

##### Do not use CORYX THROAT:

If you are hypersensitive (allergic) to local anaesthetics or to any of the other ingredients in CORYX THROAT. CORYX THROAT contains acesulfame-K and must not be used if you have phenylketonuria.

##### Take special care with CORYX THROAT:

Use CORYX THROAT as a gargle and mouth wash. Do not swallow.

Keep out of the reach and sight of children.

CORYX THROAT may cause staining and an increase of tartar on your teeth. Brushing with toothpaste which controls tartar and flossing your teeth daily may help reduce this tartar build-up and staining. In addition, you should visit your dentist at least every 6 months to have your teeth cleaned and your gums examined.

##### Using CORYX THROAT with food and drink:

CORYX THROAT may have a bitter aftertaste. Do not rinse your mouth with water immediately after using CORYX THROAT, since doing so will increase the bitterness. Rinsing may also decrease the effect of CORYX THROAT.

CORYX THROAT may change the way food tastes. Sometimes this effect may last for up to 4 hours after you have used the oral rinse. In most cases this effect will become less noticeable as you continue to use CORYX THROAT. When you stop using CORYX THROAT, your taste should return to normal.

##### Pregnancy and Breastfeeding:

The safety of this preparation in pregnancy and lactation has not been established.

If you are pregnant or breastfeeding your baby please consult your doctor, pharmacist or other health care professional for advice before using CORYX THROAT.

##### Driving and using machinery:

When used correctly CORYX THROAT is safe.

##### Using other medicines with CORYX THROAT:

Always tell your healthcare professional if you are taking any other medicine. (This includes complementary or traditional medicines).

#### 4. HOW TO USE CORYX THROAT

##### How to use the gargle

Always use CORYX THROAT exactly as indicated on the information leaflet or as your doctor has instructed you. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure. The usual dose for adults is to use 15 - 30 ml (3 - 6 medicine measuresful) undiluted, or diluted with a small quantity of warm water. Thoroughly rinse the mouth for about one minute every 3 - 4 hours as needed. Depending on the location of the pain, the solution should be swished around the mouth and/or used as a gargle. It should not be swallowed. CORYX THROAT should generally be used undiluted, but if stinging occurs, the rinse may be diluted with water.

**Gargle: Children 6 to 12 years of age:** Five (5) to fifteen (15) ml undiluted, or diluted with a small quantity of warm water and thoroughly rinse the mouth for about one minute every three (3) hours, as a gargle if able to do so, or as an oral rinse, every three (3) hours.

**Spray:** Adults: Four (4) to eight (8) sprays directly onto the painful or inflamed area, with a maximum 32 sprays per day.

Children: Two (2) to four (4) sprays directly onto the painful or inflamed area, with a maximum of 16 sprays per day.

Rinse mouth and back of throat with the solution. Do not swallow the (excess) solution. Repeat every one and a half (1½) to three (3) hours as necessary.

#### How to use the spray (see pictures)

1. Turn the nozzle sideways and upwards for 90 degrees in a clockwise direction (Figure 1).

Do not pull the nozzle upwards and to the front (Figure 2).

When using for the first time, depress/push the spray cap a few times until liquid is sprayed out from the nozzle.

Adults: Spray four (4) to eight (8) sprays directly onto the painful or inflamed area, in the back of the throat, avoiding spraying directly onto the teeth (Figure 3), with a maximum 32 sprays per day.

Children: Spray two (2) to four (4) sprays directly onto the painful or inflamed area, in the back of the throat, avoiding spraying directly onto the teeth (Figure 3), with a maximum 16 sprays per day.

2. Do not breathe in while spraying as liquid may enter the bronchus or lung if sprayed while breathing in.

3. After use, rinse the tip of the nozzle under warm water, dry and turn the nozzle back to the original position for storage (Figure 4).



If you have the impression that the effect of CORYX THROAT is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

#### If you use more CORYX THROAT than you should:

If you think your child has swallowed CORYX THROAT get emergency help at once. In addition, if a child of any age drinks CORYX THROAT and has symptoms of alcohol intoxication, such as slurred speech, sleepiness, or a staggering or stumbling walk get emergency help immediately.

In the event of overdose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control centre.

#### If you forget to use CORYX THROAT:

If you use CORYX THROAT regularly and you miss a dose, use it as soon as possible. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosage schedule. Do not double dose.

#### 5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

CORYX THROAT can have side effects.

The side effects of CORYX THROAT usually subside when the use of CORYX THROAT is stopped.

These side effects include local skin sensitivity reactions, irritation of the eyes, mouth or tongue tip, staining of the tongue, teeth, tooth fillings or dentures, change in taste, burning of the tongue and an increase in tartar on teeth.

Not all side effects reported for CORYX THROAT are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while using CORYX THROAT, please consult your doctor, pharmacist or other health care professional for advice.

#### 6. STORING AND DISPOSING OF CORYX THROAT

Store at or below 25 °C. Protect from light.

Keep the container in the outer carton. Keep the container tightly closed.

Do not use after the expiry date stated on the label.

Store all medicine out of reach of children.

Return all unused medicine to your pharmacist.

Do not dispose of unused medicine in drains or sewerage systems (e.g. toilets).

#### 7. PRESENTATION OF CORYX THROAT

Gargle: Amber glass bottles with a white plastic screw-on cap containing 200 ml solution. The bottle is packed into an outer carton.

Spray: Amber glass bottles with a white plastic screw-on cap with nozzle containing 100 ml solution. The bottle is packed into an outer carton.

#### 8. IDENTIFICATION OF CORYX THROAT

Red to pink, slightly opaque solution.

#### 9. REGISTRATION NUMBER/REFERENCE NUMBER

W/16.3/58

#### 10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

Mirren (Pty) Limited  
18 Golden Drive, Morehill, Benoni 1501  
Tel No: (011) 425-4026

#### 11. DATE OF PUBLICATION OF THE PATIENT INFORMATION LEAFLET

Date of registration: 12 October 1988.

Date of the most recently revised package insert as approved by Council: 6 June 2014.

CXT100-PI-PR-17/05

## SKEDULERINGSSTATUS [S1]

### EIENDOMSNAAM (EN DOSEERVORM)

# Coryx Throat Oplossing

## SAMESTELLING

Elke 100 ml oplossing bevat:

Bensokaïen	266,667 mg
Chloorheksidien glukonaat oplossing 20 %	1,0 ml

Ander bestanddele: Acesulfam-K, karmoisiën rooi, kaneel geur, etanol 96 %, gliserien, kruisement anys geur, polioksien 40 hidrogeneerde kasterolie, propileen glikol en gesuiwerde water.

## FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE

A.16.3 Oppervlak verdoewingsmiddels

## FARMAKOLOGIESE WERKING

### Farmakodinamiese eienskappe:

Bensokaïen het ligte plaaslik verdoewende eienskappe. Chloorheksidien is 'n bakteriedodende kationiese antiseptiese middel. Dit werk deur die bakteriese selmembran te vernietig en die sel sitoplasma te presipiteer. Daar is getoon dat chloorheksidien bind aan die hidroksiepatiet van tandemalje, op die huid van die tand oppervlakte en op die speeksel muksien. Dit los stadig op vanuit hierdie bindplekke wat 'n langdurige bakteriedodende effek vir 'n paar uur uitoefen.

### Farmakokinetiese eienskappe:

Bensokaïen word vinnig deur slymvliese en deur beskadigde vel geabsorbeer. Plaaslike verdoewingsmiddels is swak basiese en kan by weefsel pH versprei deur bindweefsel en cellulêre membrane om die senuweefsel te bereik waar ionisasie kan voorkom. Bensokaïen word hidroliseer deur esterase in die plasma en in 'n mindere mate, in die lever. Chloorheksidien word swak geabsorbeer vanuit die spysverteringskanaal en intacte vel.

## INDIKASIES

CORYX THROAT word aangedui vir die tydelike verligting van pyn en ongemak in die keel as gevolg van verkoue (en gepaardgaande lastige hoës). Dit word ook aanbeveel vir geringe mond irritasies.

## KONTRAINDIKASIES

CORYX THROAT is gekontraindikeer by pasiënte met 'n geskiedenis van hipersensitiwiteit vir plaaslike verdoewingsmiddels of enige van die ander bestanddele van CORYX THROAT.

## WAARSKUWINGS EN SPESIALE VOORSORGMATREËLS

### Waarskuwings:

Moet nie insluk nie.

### Spesiale voorsorgmaatreëls:

Sommige pasiënte kan 'n bitter nasmaak in die mond ervaar nadat hulle die mond met CORYX THROAT gespoel het. Die uitspoel van die mond onmiddellik na die gebruik van CORYX THROAT, kan die bitterheid vermeerder en die effek van CORYX THROAT verminder.

CORYX THROAT kan die smaak van voedsel by sommige pasiënte verander. Hierdie effek kan tot 4 ure duur na die gebruik van die mond spoel. In die meeste gevalle sal hierdie effek minder waarneembaar word wanneer die pasiënt aanhou om CORYX THROAT te gebruik. Wanneer die gebruik van CORYX THROAT gestaak word, behoort die smaak na normaal terug te keer. CORYX THROAT bevat acesulfam-K en moet nie aan pasiënte met fenielketonurie gegee word nie.

## INTERAKSIES

Geen bekende interaksie met ander medisyne nie.

## SWANGERSKAP EN BORSVOEDING

Die veiligheid van CORYX THROAT tydens swangerskap en borsvoeding is nog nie vasgestel nie.

## DOSEERING EN GEBRUIK AANWYSINGS

### Gorelmiddel:

**Volwassenes:** 15 - 30 ml (3 - 6 medisyne-mate vol)

**Kinders 6 tot 12 jaar oud:** 5 - 15 ml (1 - 3 medisyne-mate vol) Gebruik CORYX THROAT onverdund of verdun met 'n klein hoeveelheid warm water en spoel die mond goed vir ongeveer een minuut elke 3 tot 4 uur soos nodig. Afhangende van die plek van die pyn, moet die oplossing in die mond rond gespoel word en/of as 'n gorelmiddel gebruik word. Dit moet nie ingesluk word nie. CORYX THROAT behoort gewoonlik onverdund gebruik te word, maar as branderigheid in die mond voorkom, kan die gorelmiddel verdun word met 'n bietjie water.

### Sproei:

**Volwassenes:** Sproei vier (4) tot agt (8) spuite direk op die pylneke of ontsteekte plekke, met 'n maksimum van 32 spuite per dag. **Kinders 6 tot 12 jaar oud:** Sproei twee (2) tot vier (4) spuite direk op die pylneke of ontsteekte plekke, met 'n maksimum van 16 spuite per dag.

## PASIËNTINLIGTINGSBLAD

## SKEDULERINGSSTATUS [S1]

### EIENDOMSNAAM, STERKTE EN FARMASEUTIESE VORM

# CORYX THROAT Oplossing

Elke 100 ml bevat: 266,667 mg bensokaïen en 1,0 ml chloorheksidien glukonaat oplossing 20 %. Oplossing.

## Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u.

CORYX THROAT is beskikbaar sonder 'n doktersvoorskrif, sodat u 'n minder ernstige siekte kan behandel. Nietemin moet u nog steeds CORYX THROAT versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te verkry.

- Hou hierdie blad. U mag dit nodig vind om dit weer te lees.
- Moet nie CORYX THROAT deel met enige ander persoon nie.
- Vra u apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- U moet 'n dokter raadpleeg indien u simptome vererger of nie verbeter na 5 dae nie.

### 1. WAT CORYX THROAT BEVAT

- Die aktiewe bestanddele is: Elke 100 ml oplossing bevat: 266,667 mg bensokaïen en 1,0 ml chloorheksidien glukonaat oplossing 20 %
- Die ander bestanddele is: Acesulfam-K, karmoisiën rooi, kaneel geur, etanol 96 %, gliserien, kruisement anys geur, polioksien 40 hidrogeneerde kasterolie, propileen glikol en gesuiwerde water.

### 2. WAARVOOR CORYX THROAT VOOR GEBRUIK WORD

CORYX THROAT word aangedui vir die tydelike verligting van pyn en ongemak in die keel as gevolg van verkoue (en gepaardgaande lastige hoës). Dit word ook aanbeveel vir geringe mond irritasies.

### 3. VOOR U CORYX THROAT GEBRUIK

#### Moenie CORYX THROAT neem nie:

Indien u hipersensitiëf (allergies) is: vir plaaslike verdoewingsmiddels of enige van die ander bestanddele in CORYX THROAT. CORYX THROAT bevat acesulfam-K en monie gebruik word as 'n fenielketonurie het nie.

#### Neem spesiale sorg met CORYX THROAT:

Gebruik CORYX THROAT as 'n gorrel- en mondspoelmiddel. Moet nie insluk nie.

Hou buite bereik van kinders.

CORYX THROAT kan vlekke op die tande en 'n toename van tartar op u tande veroorsaak. Die gebruik 'n tandepasta wat tartar beheer en die daaglikse vlos van u tande, kan help om hierdie opbou van tartar en vlekke op die tande te verhoed. Daarbenewens moet u ten minste elke 6 maande u tandarts besoek om u tande te laat skoon maak en u tandvleis te laat ondersoek.

#### Neem CORYX THROAT met voedsel en vloeistof:

CORYX THROAT kan 'n bitter nasmaak hê. Moenie u mond onmiddellik met water uitspoel nadat u CORYX THROAT gebruik het nie, omdat dit die bitterheid kan verhoog. Die spoel met water kan ook die effek van CORYX THROAT verminder. CORYX THROAT kan die smaak van kos verander. Soms kan hierdie effek tot 4 ure duur nadat u die mond spoel gebruik het. In die meeste gevalle sal hierdie effek minder waarneembaar word indien u CORYX THROAT aanhou gebruik. Indien u ophou om CORYX THROAT te gebruik, behoort u smaak na normaal terug te keer.

#### Swangerskap en borsvoeding:

Die veiligheid van CORYX THROAT tydens swangerskap en borsvoeding is nog nie vasgestel nie.

Indien u swanger is of u baba borsvoed, raadpleeg u dokter, apteker of ander gesondheidsorgkundige vir advies voordat u CORYX THROAT begin gebruik.

#### Bestuur en gebruik van masjinerie:

Indien CORYX THROAT korrek gebruik word, is CORYX THROAT veilig.

#### Neem van ander medisyne saam met CORYX THROAT:

Vertel altyd u gesondheidsorgkundige indien u enige ander medisyne gebruik. (Dit sluit in komplementêre of tradisionele medisyne).

### 4. HOE OM CORYX THROAT TE GEBRUIK

Moenie medisyne wat aan u voorgeskryf is met ander mense deel nie.

Gebruik altyd CORYX THROAT presies soos aangedui op die inligtingsblaadjie of soos u dokter voorgeskryf het. U moet u dokter of apteker raadpleeg as u onseker is.

#### Gorelmiddel:

**Volwassenes:** 15 - 30 ml (3 - 6 medisyne-mate vol)

**Kinders 6 tot 12 jaar oud:** 5 - 15 ml (1 - 3 medisyne-mate vol) Gebruik CORYX THROAT onverdund of verdun met 'n klein hoeveelheid warm water en spoel die mond goed vir ongeveer een minuut elke 3 tot 4 uur soos nodig. Afhangende van die plek van die pyn, moet die oplossing in die mond rond gespoel word en/of as 'n gorelmiddel gebruik word. Dit moet nie ingesluk word nie. CORYX THROAT behoort gewoonlik onverdund gebruik te word, maar as brand van die mond voorkom, kan die gorelmiddel verdun word met 'n bietjie water.

Spoel die mond en agterkant van die keel met die oplossing. Moenie die (oormatige) oplossing insluk nie.

Herhaal elke een en 'n half (1½) tot drie (3) uur soos nodig.

#### Hoe om die sproei te gebruik (sien prente)

1. Draai die mondstuk na die kant toe en opwaarts vir 90 grade in 'n kloksgewyse rigting (Figuur 1).
2. Moenie die mondstuk opwaarts en vorentoe trek nie (Figuur 2) Wanneer dit vir die eerste keer gebruik word, druk die sproei doppie 'n paar keer totdat die oplossing begin uitspuit by die punt. Sproei die korrekte hoeveelheid spuite (sien bo vir die dosis) direk op die pylneke of ontsteekte plek, in die agterkant van die keel, vermie dit om direk op die tande te spuit (Figuur 3).
2. Moenie asemhaal gedurende die spuit nie omdat vloeistof in die bronkus of longe kan ingaan indien dit gesproei word gedurende asemhaling.
3. Spoel die mondstuk onder warm water af na gebruik, maak dit droog en draai die punt terug na die oorspronklike posisie om te bêre (Figuur 4).

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

## NEWE EFFEKTE

### Immuunstelsel afwykings:

**Minder dikwels:** Tekens van allergiese reaksies kan neusverstopping insluit, kort asem of moeilike asemhaling, veluitslag, galbulte of jeukerigheid en swelling van die gesig.

### Oogversteurings:

**Minder dikwels:** Irritasie van die konjunktiva.

### Vel- en ledemata versteurings:

**Minder dikwels:** Plaaslike vel sensitiviteitsreaksies, langdurige gebruik kan verkleuring van die tande veroorsaak. Groot swelsels in die mond of keel.

### Gastro-intestinale afwykings:

**Minder dikwels:** Irritasie van die slymvliese, irritasie van die tongpunt, omkeerbare verkleuring van tong, tande en/of saamgestelde tandheelkundige herstellings. Smaakversteurings en 'n brand gevoel van die tong. Toename in tartar (calculus) op tande.

### Liggaam as 'n geheel - algemene afwykings:

**Minder dikwels:** Geswelde kliere aan die kant van die gesig of nek.

## BEKEUDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHE VAN DIE BEHANDELING

Die mees algemene gevolg van inname is mukosa irritasie. Maagspolping met versagtende middels word voorgestel vir akute inname.

Meteemoglobinemie het by babas voorgekom na inname van bensokaïen. Stimulasie met daaropvolgende depressie van die sentrale senuweestelsel. Behandeling is simptome en ondersteunend.

Indien u dink dat u kind CORYX THROAT ingesluk het, kry dadelik noodhulp. Ook, as 'n kind van enige ouderdom CORYX THROAT drink en simptome van alkoholvergiftiging toon, soos mompelende spraak, slaperigheid of waggel of struikel wanneer loop, kry onmiddellik noodhulp.

## IDENTIFIKASIE

Roof tot pienk, effens onduersigtige oplossing.

## AANBIEDING

Gorelmiddel: Amber glasbottels met 'n wit plastiekskroef dop met 200 ml oplossing. Die bottel word in 'n karton verpak. Sproei: 100 ml oplossing verpak in amber glas bottels met 'n wit plastiek skroef dop met sproei tuit. Die bottel word in 'n karton verpak.

## BERGINGSAAANWYSINGS

Bewaar by of benede 25 °C. Beskerm teen lig.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

## REGISTRASIE NOMMER

W/16.3/58

## NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE REGISTRASIESERTIFIKAAT

Mirren (Edms) Bpk

Goldenrylaan 18, Morehill, Benoni 1501

Suid-Afrika

## DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBLIJET

Die datum op die registrasiesertifikaat van CORYX THROAT OPLOSSING: 12 Oktober 1988.

Die datum van die mees onlangse hersiene voubljet soos deur die Raad goedgekeur: 6 Junie 2014.

CXT100-PI-PR-17/05 Pro-Print

## Sproei:

**Volwassenes:** Sproei vier (4) tot agt (8) spuite direk op die pylneke of ontsteekte plekke, met 'n maksimum van 32 spuite per dag.

**Kinders 6 tot 12 jaar oud:** Sproei twee (2) tot vier (4) spuite direk op die pylneke of ontsteekte plekke, met 'n maksimum van 16 spuite per dag.

Spoel die mond en agterkant van die keel met die oplossing. Moenie die (oormatige) oplossing insluk nie.

Herhaal elke een en 'n half (1½) tot drie (3) uur soos nodig.

#### Hoe om die sproei te gebruik (sien prente)

1. Draai die mondstuk na die kant toe en opwaarts vir 90 grade in 'n kloksgewyse rigting (Figuur 1).
2. Moenie die mondstuk opwaarts en vorentoe nie trek nie (Figuur 2). Wanneer dit vir die eerste keer gebruik word, druk die sproei doppie 'n paar keer totdat die oplossing begin uitspuit by die punt.
3. Sproei die korrekte hoeveelheid spuite (sien bo vir die dosis) direk op die pylneke of ontsteekte plekke, in die agterkant van die keel, vermie dit om direk op die tande te sproei (Figuur 3).
2. Moenie asemhaal gedurende die sproei nie omdat vloeistof in die bronkus of longe kan ingaan indien dit gesproei word gedurende asemhaling.
3. Spoel die mondstuk onder warm water af na gebruik, maak dit droog en draai die punt terug na die oorspronklike posisie om te bêre (Figuur 4).

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

## Indien u meer CORYX THROAT neem as wat u moet neem:

As u dink dat u kind CORYX THROAT ingesluk het, kry dadelik noodhulp. Ook indien 'n kind van enige ouderdom CORYX THROAT drink en simptome van alkoholvergiftiging toon, soos stammelende spraak, slaperigheid of wankel of struikel wanneer loop, kry onmiddellik noodhulp. In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

#### Indien u vergeet om CORYX THROAT te neem:

Indien u gereeld CORYX THROAT gebruik en u 'n dosis oorslaan, gebruik dit so gou as moontlik. As dit agter amper tyd vir die volgende dosis is, slaan die vergete dosis oor en gaan terug na u gereelde dosis skedule. Moenie dubbel dosis toedien nie.

## 5. MOONTLIKE NEWE EFFEKTE

CORYX THROAT kan nuwe effekte hê. Die nuwe effekte van CORYX THROAT verminder gewoonlik wanneer die gebruik van CORYX THROAT gestaak word. Hierdie nuwe effekte sluit in lokale vel sensitiviteitsreaksies, irritasie van die oë, mond of tongpunt, verkleuring van die tong, tande, tandvullings of kunsgebitt, smaakverandering, tong brand en 'n toename in tartar op die tande. Nie alle nuwe effekte wat vir CORYX THROAT aangemeld is, is in hierdie blad ingesluit nie. Indien u algemene gesondheid vererger of indien u enige ongemaklike effekte ondervind wanneer u CORYX THROAT gebruik, raadpleeg u dokter, apteker of ander gesondheidskundige vir advies.

## 6. BEWARING EN WEGGOOI VAN CORYX THROAT

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders. Bewaar by of benede 25 °C. Beskerm teen lig. Hou die houer in die buitenste karton. Hou die houer styf toe. Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket aangedui word nie.

Bring alle ongebruikte medisyne terug na u apteker toe. Moet nie van ongebruikte medisyne in die drein of rioolstelsels (bv. Toilette) ontslae raak nie.

## 7. AANBIEDING VAN CORYX THROAT

Gorelmiddel: Amber glasbottels met 'n wit plastiekskroef dop met 200 ml oplossing. Die bottel word in 'n karton verpak. Sproei: 100 ml oplossing verpak in amber glas bottels met 'n wit plastiek skroef dop met sproei tuit. Die bottel word in 'n karton verpak.

## 8. IDENTIFIKASIE VAN CORYX THROAT

Roof tot pienk, effens onduersigtige oplossing.

## 9. REGISTRASIE NOMMER/VERWYSINGS NOMMER

W/16.3/58

## 10. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

Mirren (Edms) Bpk

Goldenrylaan 18, Morehill, Benoni 1501

Suid-Afrika

Tel No: (011) 425-4026

## DATUM VAN PUBLIKASIE VAN DIE PASIËNTE INLIGTINGSBLAD

Datum van registrasie: 12 Oktober 1988.

Datum van die mees onlangse hersiene pasiënt inligtingsblad soos deur die Raad goedgekeur: 6 Junie 2014.

CXT100-PI-PR-17/05 Pro-Print